

MORDEDURA DE OFIDIO

PICADURA DE ARAÑA

PICADURA DE ALACRÁN

- Identificar de ser posible al ofidio.
- Lavar con agua, jabón y antiséptico.
- Controlar vacunación antitetánica.
- Analgesicos.

- No aplicar medicamentos tópicos.
- No torniquete ni hielo.
- Evaluar la necesidad de derivación a un centro de mayor complejidad.

- Identificar a la araña.
- Retirar elementos de compresión.
- Elevar los miembros afectados.
- Antisepsia y antitetánica.
- Controlar vacunación antitetánica.

- En todos los casos de escorpionismo se debe realizar la ficha epidemiológica.

TIPO	YARARÁ	CASCABEL	CORAL	LOXOSCELES	LACTRODECTUS	ALACRÁN	
LEVE	<p>SÍNTOMAS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dolor. - Edema sin manif. sistémicas. <p>ACCIÓN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Neutralizar: - 75/100 mg. de veneno. - 2/4 ampollas. 	<p>SÍNTOMAS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Eritema - Edema leve sin dolor - Anestesia <p>ACCIÓN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Neutralizar: - 50 mg. de veneno. - 4/5 ampollas. 	<p>TODOS LOS CASOS son considerados como graves por el riesgo de insuficiencia respiratoria.</p> <p>SÍNTOMAS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Locales mínimos: Dolor, edema y anestesia local. - Generales: Veneno neurotóxico exclusivo, de rápida acción. - A los 5/20 min. de la mordedura produce parálisis muscular ascendente progresiva con insuficiencia cardiorespiratoria. <p>ACCIÓN</p> <ul style="list-style-type: none"> - 10 ampollas antiveneno coral 	<p>LOCALES</p> <p>Dolor / Edema / Papula y vesículas equimóticas / Placa marmorea / Escara.</p> <p>Suero malbran: - 5 ampollas.</p>	<p>LOCALES</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dolor - Eritema - Piloerectio <p>Suero malbran: - 1 ampollas.</p>	<p>LOCALES</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dolor. - Ardor muy intenso. - En los niños provoca llanto. <p>Control en guardia del cuadro por 4 hs.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Si no se modifica el cuadro: Tratamiento sintomático: frío local y alta institucional - Si se agrava el cuadro: comienza a ser un cuadro de gravedad intermedia. 	
MODERADO	<p>SÍNTOMAS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Afectación de más de un segmento anatómico. - Hemorragias locales. <p>ACCIÓN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Neutralizar: - 100/200 mg. de veneno. - 4/8 ampollas. 	<p>SÍNTOMAS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Neurotoxicidad. - Mialgias con o sin alteración del color de la orina. - Alt. de la coagulación. <p>ACCIÓN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Neutralizar: - 100 mg. de veneno. - 8/10 ampollas. 		<p>SÍNTOMAS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dolor / Edema con manif. sistémicas / Afectación de más de un segmento anatómico / Hemorragias / Alt. coagulación / hipotensión / Shock / Ira. <p>ACCIÓN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Neutralizar: - + de 200 mg. de veneno - 20 ampollas 	<p>SISTÉMICOS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hemólisis intravascular - CID / IRA - Evaluar hemoglobinuria <p>Suero malbran: - 10 ampollas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Espasmos musculares - Taquicardia/bradicardia - HTA <p>Suero malbran: - 1 ampollas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Vómitos/Palidez/Sudoración. - Aumento de las secreciones. - Alteración de la frecuencia cardíaca. - Alteración de presión arterial. - Miosis o midriasis <p>Neutralizar: - 150 dl.</p>
GRAVE	<p>SÍNTOMAS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dolor / Edema con manif. sistémicas / Afectación de más de un segmento anatómico / Hemorragias / Alt. coagulación / hipotensión / Shock / Ira. <p>ACCIÓN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Neutralizar: - + de 200 mg. de veneno - 20 ampollas 	<p>SÍNTOMAS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Neurotoxicidad / Facie miasténica - Orina oscura por rhabdomiólisis oligiuria / IRA / shock / alt de la coagulación. <p>ACCIÓN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Neutralizar: - + de 200 mg. de veneno - 20 ampollas 			<p>SISTÉMICOS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Arritmia - HTA/EAP - Alucinaciones - Abdomen en tabla <p>Suero malbran: - 2 ampollas.</p>	<p>SÍNTOMAS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vómitos incoercibles / Marcado aumento de secreciones / Hiper o hipotermia / Hipo o hipertensión / Taquicardia o bradicardia / Arritmias cardíacas o respiratorias / ICC / miocarditis aguda / EAP / Pancreatitis aguda / Excitación psicomotriz / Depresión del sensorio / Coma / shock. <p>Neutralizar: - 300 dl.</p>	